

Définition et réalisation

La laparotomie consiste en une incision de la paroi abdominale permettant une chirurgie à ciel ouvert. Le type d'incision (horizontale ou verticale) sera choisi en fonction de la pathologie sous-jacente.

Types d'interventions

1. Myomectomie
2. Annexeomie
3. Microchirurgie de type réanastomose tubaire
4. Hystérectomie pour tumeur bénigne ou maligne

Certaines indications impliquent une hospitalisation préopératoire de 48 à 72 heures, afin de réaliser une préparation intestinale (antibiothérapie intraveineuse, lavements, régime).

Inconvénients mineurs (liste non exhaustive)

Nausées, douleurs au niveau de la cicatrice abdominale, miction douloureuse, ballonnement abdominal, pertes de sang vaginales.

Complications postopératoires (liste non exhaustive)

Saignement au niveau de paroi abdominale, rétention urinaire, infection, plaie intestinale, plaie de la vessie ou de l'uretère, brûlure cutanée.

Le saignement interne est exceptionnel.

Recommandations

- Hospitalisation : 5 à 10 jours
- Convalescence : en général de 4 à 6 semaines en fonction du type d'intervention.

**LA CHIRURGIE
GYNECOLOGIQUE
EFFECTUEE PAR
LAPAROTOMIE**