

Définition et réalisation

Le laparoscope est un télescope chirurgical qui est introduit dans la cavité abdominale au travers d'une incision ombilicale. Trois incisions sont souvent effectuées au niveau du pubis, afin d'introduire des ciseaux, pinces à coagulation ou autres instruments chirurgicaux. Cette technique permet d'éviter de larges incisions abdominales et diminue nettement la durée de l'hospitalisation. Cette intervention est toujours réalisée sous anesthésie générale.

Types d'interventions

1. Ligature tubaire par clips
2. Exérèse d'une/des trompe(s) ou d'un/des ovaire(s)
3. Section des ligaments sacro-utérins
4. Section d'adhérences
5. Vaporisation d'endométriome
6. Kystectomie ovarienne
7. Exérèse de fibrome(s) utérin(s)

8. Hystérectomie
9. Sacrofixation
10. Nodule de la lame recto-vaginale

Certaines indications impliquent une hospitalisation préopératoire de 48 à 72 heures, afin de réaliser une préparation intestinale (antibiothérapie intraveineuse, lavements, régime).

Inconvénients mineurs (liste non exhaustive)

Nausées, douleurs abdominales pouvant irradier jusqu'aux épaules, maux de gorge, miction douloureuse, ballonnement abdominal, pertes de sang vaginales.

Complications postopératoires (liste non exhaustive)

Saignement interne ou au niveau de la paroi, rétention urinaire,

infection, plaie intestinale, plaie de la vessie ou de l'uretère.

Des complications majeures nécessitant un acte chirurgical urgent ou différé, telles que plaie au niveau de l'utérus, des trompes, des ovaires, de l'intestin, de la vessie, de l'uretère ou autres organes sont exceptionnelles mais peuvent survenir.

Après exploration abdomino-pelvienne au moment de la laparoscopie, une chirurgie ouverte (laparotomie) peut être pressentie comme plus indiquée. Cette éventualité est discutée en préopératoire en fonction des antécédents personnels. La chirurgie ouverte implique un séjour hospitalier de 5 à 10 jours, ainsi qu'une convalescence de 3 à 6 semaines.

Recommandations

- Hospitalisation :

3 jours (généralement pour les interventions de 1 – 6)

5 jours (généralement pour les interventions de 7 – 10)

- Convalescence : de 8 jours à 3 – 4 semaines en fonction du type d'intervention.

LA LAPAROSCOPIE OPERATOIRE