

Principaux effets secondaires des traitements proposés en prophylaxie HIV

Nom commercial	Effets secondaires courants	Effets secondaires rares et interactions	restriction alimentaire
Viread®	Nausées, vomissements, diarrhées, hypophosphorémie	Insuffisance rénale	non
Epivir®	Nausées, vomissements, diarrhées, céphalées, douleurs abdominales, rash, insomnie, fatigue	Acidose lactique	non
Combivir®	Idem Epivir, troubles hématologiques (anémie)	Acidose lactique	non
Kaletra®	Nausées, diarrhées vomissements, céphalées, douleurs abdominales, majoration des enzymes hépatiques, fatigue, hyperlipidémie	Attention interaction cytochrome P 450	Au repas
Telzir®	Nausées, diarrhées vomissements, céphalées, douleurs abdominales, rash	Attention interaction cytochrome P 450	non
Invirase®	Nausées, diarrhées vomissements, céphalées, douleurs abdominales, céphalées, fatigue	Attention interaction cytochrome P 450	
Reyataz®	Troubles digestifs. Ictère oculaire (par augmentation de la bilirubine sanguine)	Attention interaction cytochrome P 450	Au repas
Norvir®	Nausées, diarrhées vomissements, céphalées, douleurs abdominales, céphalées, douleurs musculaires	Attention interaction cytochrome P 450	Prendre en mangeant diminue les nausées